

## Quali sono le forme cliniche della celiachia?

### **Una breve descrizione delle quattro forme in cui si manifesta la celiachia.**

Vista l'eterogeneità della sintomatologia della celiachia è consuetudine suddividere la celiachia in varie forme cliniche:

#### **La celiachia tipica**

Le forme tipiche esordiscono precocemente, in genere a distanza di alcuni mesi dall'inizio dello svezzamento, con i sintomi del malassorbimento intestinale: diarrea cronica, arresto della crescita, inappetenza, vomito e distensione addominale (il cosiddetto "pancione").

#### **La celiachia atipica**

Le forme atipiche si manifestano tardivamente con sintomi prevalentemente extra-intestinali quali anemia con carenza di ferro, aumento delle transaminasi epatiche, dolori addominali ricorrenti, ipoplasia dello smalto dentario, dermatite erpetiforme o bassa statura in età scolare.

#### **La celiachia silente**

Le forme silenziose sono diagnosticate in soggetti apparentemente sani, in seguito a un controllo occasionale. Molti casi sono silenti solo in apparenza; in realtà dopo l'avvio del trattamento si registra un miglioramento del benessere psico-fisico.

#### **La celiachia potenziale**

Si definiscono potenziali i casi che presentano markers sierologici positivi e biopsia intestinale normale. I pazienti con celiachia potenziale, se lasciati a dieta libera, possono sviluppare nel tempo una lesione intestinale conclamata. Un'elevata frequenza di celiachia, spesso subdola, si rileva nei soggetti affetti da patologie autoimmuni (soprattutto diabete insulinodipendente e tiroidite), sindromiche (s. di Down, s. di Turner e s. di Williams) o con insufficienza di IgA sieriche.

Art. preso dal sito [www.drschaer-institute.com](http://www.drschaer-institute.com)