

PREPARAZIONE PRE - ESAME

<p>Acido 5-OH indolacetico</p> <p>Ac. Vanilmandelico Urinario</p> <p>Serotonina</p>	<p>ACIDIFICARE CON HCL:</p> <p>Portare il contenitore delle 24 ore presso lo studio Bio Medico per l'inserimento dell'acido.</p>	<p>DIETA:</p> <p>A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame.</p>
--	---	--

<p>Breath Test al Lattosio</p> <p>Lattulosio</p> <p>Glucosio</p>	<p>PREPARAZIONE ALL'ESAME:</p> <p>Il giorno antecedente l'esame è necessario seguire la dieta sotto indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COLAZIONE: caffè d'orzo, the, biscotti secchi o pane tostato - PRANZO: riso o pasta conditi con olio o parmigiano reggiano - POMERIGGIO: caffè d'orzo, the, biscotti secchi o pane tostato - CENA: carne bianca (pollo, coniglio o tacchino), pesce, riso condito con olio. <p>La mattina dell'esame bisogna rispettare il digiuno; 2 ore prima dell'esame si può bere solo acqua minerale non gassata. Prima di recarsi in laboratorio, è consigliato effettuare dei risciacqui del cavo orale con clorexedina (tipo tamtum verde). È necessario non utilizzare pasta dentifricia.</p> <p>Se è un fumatore dovrà astenersi dal fumo almeno dalla sera prima.</p>	<p>AVVERTENZE:</p> <p>Per garantire una adeguata accuratezza del test è indispensabile seguire le istruzioni sotto elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle ultime 4 settimane non devono essere assunti antibiotici; - Nelle ultime 2 settimane non devono essere assunti lassativi, fermenti lattici o aver praticato clisteri per la pulizia intestinale; - In caso di assunzione di altri farmaci, è necessario informare l'operatore per assicurarsi che questi non interferiscano con i risultati del test; - È obbligatorio informare l'operatore di patologie quali diabete o altro.
---	--	---

<p>Breath Test Urea C13 (ricerca H. Pylori)</p>		<p>AVVERTENZE: Per garantire una adeguata accuratezza del test è indispensabile seguire le istruzioni sotto elencate: Nelle ultime 2 settimane non devono essere assunti : - antibiotici, - inibitori di pompa protonica (PPI) aventi come principio attivo: l' Omeprazolo (Antra, Losec, Mepral, Omeprazen); il Lansoprazolo (Lansox, Limpidex, Zoton); l' Esomeprazolo (Axagon); il Pantoprazolo (Pantecta, Pantopan, Pantorc, Peptazol); il Rabeprazolo (Pariet), - antiacidi aventi come principio attivo: la Cimetidina (Biomag, Brumetidina, Citimid, Dina, Eureceptor, Stomet, Tagamet, Temic, Ulcedin, Ulcodina, Ulcomedina, Ulis); il Cloridrato di Cimetidina (Notul, Ulcestop); Ranitidina (Raniben, Ranibloc, Ranidil, Ranidiz, Ulcex, Zantac); Nizatidina (Cronizat, Nizax, Zanizal); Famotidina (Famodil, Gastridin); Pirenzepina (Leblon).</p>
<p>Catecolamine urinarie frazionate</p> <p>Cortisolo urinario</p> <p>Dopamina urinaria</p> <p>Metanefrine Normetanefrine</p> <p>Ossaluria</p>	<p>ACIDIFICARE CON HCL: Portare il contenitore delle 24 ore presso lo studio Bio Medico per l'inserimento dell'acido.</p>	
<p>Esame Citologico urinario (I-II-III campioni)</p>	<p>Passare dal laboratorio per ritirare i contenitori con acido. Raccogliere la SECONDA URINA del mattino per tre giorni consecutivi.</p>	

Idrossiprolinuria		<p>Il dosaggio dell'idrossiprolinuria urinaria si esegue sulle urine delle 24h.</p> <p>Nei 3 giorni precedenti la raccolta non devono essere assunti cibi come: carne, derivati della carne, brodo ed estratti di carne, prodotti contenenti gelatina, pesce, dolci, uova.</p> <p>Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci.</p>
--------------------------	--	--

Cortisolo salivare	<p>Utilizzare il raccoglitore Salivette (fornito dal laboratorio)</p> <p>Effettuare la raccolta all'ora indicata dal medico curante. Per il prelievo "midnight" raccogliere il campione tra le ore 23:00 e le 24:00.</p> <p>Stringere saldamente il bordo del contenitore interno e rimuovere il tappo, la rimozione è facilitata se lo si spinge lateralmente facendo attenzione a non staccare il contenitore interno da quello esterno.</p> <p>Far scivolare il tampone in bocca battendo delicatamente il fondo della provetta. NON TOCCARE IL TAMPONE CON LE DITA.</p> <p>Masticare lentamente il tampone o mantenerlo sotto la lingua per 2 minuti quindi riposizionarlo nel contenitore. Chiudere la Salivette premendo con decisione sul tappo.</p> <p>Mantenere la salivette in frigo e consegnare al più presto in Laboratorio.</p>	<p>AVVERTENZE:</p> <ul style="list-style-type: none">- Evitare stress fisici o psichici nelle ore precedenti <p>Nell'ora precedente la raccolta:</p> <ul style="list-style-type: none">- non mangiare- non assumere alcool- non fumare <p>Lavarsi i denti solo dopo la raccolta evitare di raccogliere il campione in presenza di sanguinamenti delle mucose del cavo orale</p>
---------------------------	--	---

